



La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) continúa siendo una causa importante de morbi-mortalidad en adultos.



La llegada del SARS-CoV2 como nueva causa de NAC y la reciente aprobación y disponibilidad de cuatro vacunas seguras y eficaces frente al mismo, constituyen el cambio más significativo.



Las vacunas frente al neumococo, la gripe, la tosferina y la COVID-19 pueden contribuir a disminuir la carga de enfermedad por NAC y sus complicaciones asociadas.



La evidencia disponible avala las indicaciones prioritarias recomendadas en esta guía, que debería lograr una difusión e implementación amplia en la práctica clínica.

OBJETIVO

Este calendario tiene una perspectiva de salud individual y persigue orientar la recomendación del profesional sanitario a cada usuario individual, de modo que se pueda realizar una información y educación individualizada que permitan al potencial candidato vacunal la decisión que más le convenga en función de la indicación y las circunstancias particulares del individuo.

LIMITACIONES

Nuestras recomendaciones no pretenden interferir con las recomendaciones oficiales vigentes en cada Comunidad o Ciudad Autónoma de nuestro país, ya que, en algunos casos, no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud.

CONTACTA

@neumo_experto




www.neumoexpertos.org



REDONDO E, RIVERO-CALLE I, MASCARÓS E, YUSTE JE, FERNÁNDEZ-PRADA M, OCAÑA D, JIMENO I, GIL A, MOLINA J, DÍAZ-MAROTO JL, LINARES M, MARTÍNÓN-TORRES F; EN NOMBRE DE NEUMOEXPERTOS EN PREVENCIÓN. VACUNACIÓN FRENTE A LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DEL ADULTO. ACTUALIZACIÓN 2021 DEL POSICIONAMIENTO DEL GRUPO DE NEUMOEXPERTOS EN PREVENCIÓN. SEMERGEN. 2021 JUL 29;51138-3593(21)00180-5.

GUÍA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC)



Actualización **2021** del posicionamiento del grupo **neumoexpertos** en prevención



**NEUMO
EXPERTOS
EN PREVENCIÓN**

GUÍA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA NAC EN EL ADULTO 2021



SE DEBEN VACUNAR

- Adulto con condiciones de inmunosupresión**
- Mayores de 70 años con más de 2 patologías crónicas**

- Adultos con patología crónica respiratoria, cardiovascular, hepática, renal no avanzada y diabetes mellitus

- Mayores de 60-65 años (sin patología de base)

- Sd Down
- Demencias
- Enfermedades neuromusculares
- Tabaquismo
- Enolismo
- Obesidad
- Esquizofrenia
- Población vulnerable por criterios socioeconómicos
- Antecedente de neumonía por COVID-19

- Antecedente de ENI
- Fístula de LCR
- Asplenia
- Implante coclear

- Determinadas profesiones***

- Embarazo

- Enfermedades de base autoinmune reumatológicas o digestivas que no reciben tratamiento inmunosupresor
- Hemoglobinopatías y anemias

- Adultos de 18 a 60 años

GRIPE



VNC13



COVID-19



TOSFERINA



VNP23*



* En pauta secuencial junto con VNC13.

**Insuficiencia renal avanzada, cáncer de órgano sólido o hematopoyético. Inmunosupresión originada por la infección de VIH, por fármacos, en los receptores de trasplantes, u otras causas de inmunosupresión o inmunodeficiencia.

*** El catálogo de profesiones puede ser diferentes en cada enfermedad y queda definido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

REDONDO, E. RIVERO, C. CALLE, I. MASCARÓS, E. VUITE, J.F.
RESUMEN DE PRÁCTICA CLÍNICA EN NEUMOLOGÍA
MAYO 2021. INDICADOR DE CALIDAD EN NEUMOLOGÍA
RESUMEN DE PRÁCTICA CLÍNICA EN NEUMOLOGÍA

